ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
ЛАЕННЕК

Регистрационный номер:

Торговое название: Лаеннек

Лекарственная форма: раствор для инъекций

Состав

В 2 мл препарата содержится 112 мг гидролизата плаценты человека, вода для инъекций, корректор pH (натрия гидроксид или кислота хлористоводородная).

Описание
Прозрачная жидкость от светло-желтого до коричневого цвета с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа
Гепатопротекторное средство.

Код АТХ: A05BA

Фармакологические свойства
Биологически активные вещества, находящиеся в гидролизате, стимулируют регенерацию (пролиферацию) гепатоцитов, снижают отложение липидов и холестерина в печеночных клетках, повышают активность тканевого дыхания, активизируют обмен веществ в печени, снижают интенсивность развития соединительной ткани в печени.

Показания к применению
Хронические заболевания печени: стеатогепатиты (алкогольной, метаболической и смешанной этиологии).

Противопоказания
Гиперчувствительность, детский возраст (отсутствие опыта по применению).

С осторожностью
С осторожностью следует применять препарат у пациентов, страдающих поливалентной аллергией на лекарственные препараты, а также у лиц пожилого возраста.

Беременность и лактация:
Экспериментальные исследования Лаеннека не выявили его токсического и тератогенного действия. В ходе дальнейших клинических исследованиях также не были отмечены побочные эффекты или какие-либо нежелательные явления при применении данного препарата беременным и кормящим женщинам.

Способ применения и дозы
Внутримышечно: по 2 мл в сутки (112 мг активного вещества гидролизата плаценты). В зависимости от тяжести заболевания частота инъекций может быть увеличена до 2-3 раз (до 6 мл) в сутки.
Внутривенное капельное введение: 10 мл (560 мг гидролизата плаценты) препарата (5 ампул) растворяют в 250-500 мл 5% раствора декстрозы или физиологического раствора и вводят через локтевую вену в течение 1,5 - 2 часов. Инъекции проводят ежедневно. Курс лечения 2-3 недели.

Побочное действие
Отмечается у 3,7% больных.
Клинически значимые нежелательные реакции.

Возможны аллергические реакции, в том числе анафилактический шок.

Другие нежелательные явления

Болезненность в месте инъекции	2.56%
Аллергические реакции (покраснение, зуд кожи)	0.37%
Онеменение в месте инъекции	0.37%
Гинекомастия (причинно-следственная связь с введением препарата не установлена)	0.37%

Передозировка: в настоящее время о случаях передозировки Лаеннека не сообщалось.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:
При смешивании Лаеннека с другими препаратами, являющимися сильными основаниями (pH выше 8.5), в результате фармацевтического взаимодействия его активность снижается.
Сведения о каких-либо других клинически значимых взаимодействиях Лаеннека до настоящего времени отсутствуют.

Применение препарата у детей
Исследования по безопасности применения Лаеннека у недоношенных детей, новорожденных грудных и несовершеннолетних детей не проводились. Применение у детей не рекомендуется.

Применение препарата у пожилых
Согласно имеющимся в настоящее время данным пожилой возраст не является противопоказанием для назначения Лаеннека. Тем не менее, поскольку физиологические функции у пожилых людей ухудшаются, применение препарата должно проводиться под тщательным контролем.

Форма выпуска
Раствор для инъекций.По 2 мл в ампулах темного стекла гидролитического класса 2 каждая ампула имеет пятно белого цвета, обозначающее место надлома ампулы. По 10 или 50 ампул в картонную пачку с перегородками из картона с инструкцией по применению.
Упаковка для стационара: 200 ампул в картонную пачку с перегородками из картона с инструкцией по применению.

Срок годности
3 года.
Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения
При температуре от 18 до 25° С в защищенном от света месте.
Хранить в местах, недоступных для детей.

Условия отпуска из аптек
По рецепту.

Производитель
Джапан Биопродактс Индастри Ко., Лтд., 44-4, 3Томигая, Шибуя-ку,Токио, 151-0063, Япония..
Организация, принимающая претензии, эксклюзивный дистрибьютор в России.
ООО Клиника «РАНА», 123242, Москва, ул. Зоологическая, д.22, тел.:766-23-36.

Представитель фирмы Кулигин А..А.

И.. о. директора ИДКЭЛС Васильев А.Н.