

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

ЛИЗИНОПРИЛ ШТАДА

таблетки 5 мг, 10 мг и 20 мг

ООО «МАКИЗ-ФАРМА», Россия

ООО «Хемофарм», Россия

Изменение № 3

Дата внесения Изменения « » 260814 20 г.

Старая редакция	Новая редакция
<p>Состав</p> <p>1 таблетка содержит:</p> <p><u>активное вещество:</u> лизиноприла дигидрата 5,445 мг, 10,89 мг и 21,78 мг (в пересчете на лизиноприл 5, 10 и 20 мг соответственно);</p> <p><u>вспомогательные вещества:</u> маннитол 12,5 мг/ 13,0 мг/ 30,0 мг, целлюлоза микрокристаллическая 23,255 мг/ 25,0 мг/ 27,0 мг, лудипресс ЛЦЕ (лактозы моногидрат 94,7 – 98,3 %, повидон 3 – 4 %) - 60,0 мг/ 61,0 мг/ 78,02 мг, повидон – К25 - 4,0 мг/ 4,5 мг/ 6,4 мг, кремния диоксид коллоидный 2,5 мг/ 3,61 мг/ 6,0 мг, магния стеарат 1,3 мг/ 1,5 мг/ 2,2 мг, кроскармеллоза натрия 5,0 мг/ 5,0 мг/ 5,0 мг, кальция гидрофосфат 130,0 мг/ 150,0 мг/ 220,0 мг.</p>	<p>Состав</p> <p>1 таблетка содержит:</p> <p><u>действующее вещество:</u> лизиноприла дигидрат 5,445 мг, 10,89 мг и 21,78 мг (в пересчете на лизиноприл 5 мг, 10 мг и 20 мг соответственно);</p> <p><u>вспомогательные вещества:</u> маннитол 12,5 мг/ 13,0 мг/ 30,0 мг, целлюлоза микрокристаллическая 23,255 мг/ 25,0 мг/ 27,0 мг, лудипресс ЛЦЕ (лактозы моногидрат 94,7 – 98,3%, повидон 3 – 4%) - 60,0 мг/ 61,0 мг/ 78,02 мг, повидон – К25 - 4,0 мг/ 4,5 мг/ 6,4 мг, кремния диоксид коллоидный 2,5 мг/ 3,61 мг/ 6,0 мг, магния стеарат 1,3 мг/ 1,5 мг/ 2,2 мг, кроскармеллоза натрия 5,0 мг/ 5,0 мг/ 5,0 мг, кальция гидрофосфат 16,0 мг/ 25,5 мг/ 43,6 мг.</p>

По доверенности ОАО «Хемофарм»



Е.А. Агафонова

Е.А. Агафонова