сигнальная полоса 4 – 5мм

obl pharm

ВИНПОЦЕТИН-OBL

Винпоцетин

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения
ВИНПОЦЕТИН-OBL

Регистрационный номер: P N003891/01
Торговое название: Винпоцетин-OBL
Международное непатентованное название: Винпоцетин
Химическое название: этил - (3альфа, 16альфа) - эбурнаменин - 14 -карбоксилат
Лекарственная форма: таблетки, покрытые оболочкой

Состав:
Одна таблетка содержит 5 мг или 10 мг винпоцетина в качестве *активного вещества* и *вспомогательные вещества* (крахмал прежелатинизированный, лактоза, кополивидон, целлюлоза микрокристаллическая, магния стеарат, тальк, кремния диоксид коллоидный (аэросил), гипромеллоза, макрогол, титана диоксид, краситель голубой).

Описание:
Таблетки круглые, двояковыпуклой формы, для дозировки 10 мг - с риской, покрытые оболочкой голубого цвета.

Фармакотерапевтическая группа: церебровазодилатирующее средство

Код АТХ: [N06BX18]

Фармакологические свойства
Обладает сосудорасширяющим, антигипоксическим и антиагрегационным действием. Ингибирует фосфодиэстеразу и повышает содержание циклического аденозинмонофосфата в клетках, что, в свою очередь, приводит к снижению содержания кальция в цитоплазме гладкомышечных клеток и расслаблению миофибрилл. Сочетает сосудистое и метаболическое действия. Расширяет сосуды мозга, усиливает кровоток, преимущественно в ишемизированных областях, улучшает снабжение мозга кислородом. Способствует утилизации глюкозы и повышает уровень катехоламинов в центральной нервной системе, стимулирует метаболизм норадреналина и серотонина в тканях мозга.
Уменьшает агрегацию тромбоцитов, вязкость крови, способствует повышению деформируемости эритроцитов и нормализации венозного оттока на фоне снижения сопротивления мозговых сосудов. Системное артериальное давление незначительно понижается. Эффективен в остром периоде инсульта: ускоряет регресс общемозговой и очаговой неврологической симптоматики, улучшает память, внимание, интеллектуальную продуктивность.
В пожилом и старческом возрасте чувствительность мозговых сосудов к релаксирующему действию винпоцетина возрастает, что обусловлено сенсибилизацией системы аденилатциклазы - циклического аденозинмонофосфата при старении.

Фармакокинетика
Быстро всасывается из желудочно-кишечного тракта, биодоступность около 60%.
Максимальная концентрация в плазме крови достигается через 1 час. Легко диффундирует через гистогематические барьеры (в том числе и через гематоэнцефалический барьер) и проникает в ткани. Период полувыведения около 5 часов.

Показания к применению
Острые (после окончания курса парентерального введения винпоцетина, а также в случаях, когда парентеральное введение не показано или невозможно) и хронические формы недостаточности мозгового кровообращения (в том числе острая и резидуальная стадии инсульта, транзиторные ишемические атаки, энцефалопатии, мультиинфарктная деменция).
Сосудистые заболевания сетчатки и/или сосудистой оболочки глаза (вследствие атеросклероза, ангиоспазма, тромбоза); дегенеративные изменения желтого пятна, вызванные атеросклерозом или ангиоспазмом; вторичная глаукома (вследствие обтурации сосудов).
Возрастные сосудистые или токсические (медикаментозные) нарушения слуха, болезнь Меньера, головокружения лабиринтного происхождения.
Вегетативные проявления климактерического синдрома.

Противопоказания
Гиперчувствительность, выраженные нарушения ритма сердца, ишемическая болезнь сердца (тяжелое течение), острая стадия геморрагического инсульта, беременность, период лактации.

Способ применения и дозы
Внутрь по 5-10 мг 3 раза в день в течение 2 месяцев. Перед отменой препарата следует постепенно снижать дозировку. Возможны повторные курсы 2-3 раза в год.

Побочное действие
Снижение артериального давления, тахикардия, экстрасистолия, замедление внутрижелудочковой проводимости.

Передозировка
При интоксикации рекомендуются промывание желудка, прием активированного угля и симптоматическое лечение.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Повышает риск геморрагических осложнений на фоне гепаринотерапии.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания
Винпоцетин проникает через плацентарный барьер и поэтому противопоказан при беременности.
При этом его концентрация в плаценте и в крови плода ниже, чем в крови беременной.
При высоких дозах возможно плацентарное кровотечение и спонтанные аборты, вероятно в результате усиления плацентарного кровоснабжения.
Период грудного вскармливания: в течение часа в грудное молоко проникает 0,25 % принятой дозы препарата. При применении препарата необходимо прекратить грудное вскармливание.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами
Исследования о влиянии на способность управлять транспортными средствами не проводились. При возникновении нежелательных реакций со стороны нервной системы, следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и работе с механизмами.

Форма выпуска
Таблетки, покрытые оболочкой 5 мг и 10 мг.
По 10, 15, 20, 30 таблеток в контурную ячейковую упаковку. По 1, 2, 3, 5 или 10 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения
В сухом защищенном от света и недоступном для детей месте, при температуре не выше 25 °С.

Срок годности
3 года.
Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек
По рецепту.

Производитель/организация, принимающая претензии
ЗАО «Фармацевтическое предприятие «Оболенское», Россия,
142279, Московская обл., Серпуховский район, п. Оболенск, корп. 7-8, корп. 39.
Тел./факс: (4967) 36-01-07.
www.obolensk.ru

98 мм

138 мм

244 мм

ПРОМИС

ЗАКАЗЧИК	ЗАО «ФП «Оболенское»	
ИЗДЕЛИЕ	инструкция/Винпоцетин-OBL, таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг, 50, Россия	
Код на портале	2786	
ВЕРСИЯ №	1	
СТОРОНА ИЗДЕЛИЯ	лицо (без оборота)	
КОД МАКЕТА	В-17-01	
ФАРМ-КОД	166	
РАЗМЕР ИЗДЕЛИЯ	140х300 мм	
НАПРАВЛЕНИЕ ДОЛЕВОЙ	вдоль 300 мм	
ТИСНЕНИЕ	КОНГРЕВНОЕ	нет
	ФОЛЬГОЙ	нет
	ГОЛОГРАММА	нет
ЦВЕТА ПЕЧАТИ	Black	
ЛАКИРОВАНИЕ	ВД	УФ
	нет	нет
МАСШТАБ	100 % при печати на формате А3.	
УТВЕРЖДАЮ	_____ /_____ /	
ДАТА УТВЕРЖДЕНИЯ		

ПРОВЕРЕНО:
КОРРЕКТОР АО ПРОМИС _____ /_____/ Kochetova_T 2016.02.08 13:23:01 +03'00'

ТЕХНОЛОГ АО ПРОМИС _____ /_____ /

Выполнил: С. Кузнецова С. Кузнецова 2016.02.08 13:51:38 +03'00'

Проверено _____ /_____/
«____» _____20_____

Распечатка на цветном принтере не является эталоном цветопередачи.

ВНИМАНИЕ! При согласовании оригинал-макета окончательную проверку текстовой и графической информации осуществляет заказчик.

Размер шрифта основного текста при масштабе 100% Arial 7 pt